

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, Avenue Nationale, La Neuville, B.P. 1154, 51056 Reims Cedex, Tél. 09.06.43

ABONNEMENT : A ou B : 80F  
A + B : 130F

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction  
Départementale de l'Agriculture  
à Châlons-sur-Marne

BULLETIN N° 24 du 28 Septembre 1983

ÉDITION GRANDES CULTURES

Envoi N° 19

## POMME DE TERRE

Dans le passé les variétés féculières tardives comme Kaptah-Vandel ont montré d'intéressantes possibilités de rattrapage en fin de végétation. Aussi de nombreux planteurs sont décidés à maintenir ces variétés le plus longtemps possible en végétation.

La situation sanitaire est saine dans l'ensemble mais le mildiou commence à faire son apparition sur Kaptah. Aussi pour les parcelles arrachées tardivement, après les 5-8 octobre, réaliser un traitement avec un produit de contact dès réception du bulletin.

## COLZA D'HIVER

### Ravageurs :

Le vol d'altises s'est fortement intensifié depuis la remontée des températures. Les captures en bac jaune sont localement importantes. Aussi de nombreuses cultures vont mériter un traitement.

Grosse Altise



Premières captures de charançon du bourgeon terminal dans l'Aube et la Marne (secteur de Vitry le François).

Une visite des parcelles est conseillée ; en l'absence de protection microgranulés au semis :

- réaliser un traitement rapidement si l'altise est présente et si 3 pieds sur 10 portent des morsures.
- dans le cas contraire un traitement est à envisager vers la fin de la semaine prochaine si le vol de charançon venait à se confirmer pour les régions concernées de la Haute-Marne, Aube et Marne (Surveillez vos cultures grâce au bac jaune, information dans notre prochain bulletin).

Charançon du bourgeon terminal



..P.6.8

Utiliser l'une des pyréthréinoïdes suivantes :

Matière Active	Dose m. a./ha	Produit commercial	Dose P.D./ha
cyperméthrine	25 g	RIPCORD 5	0,4 l
		CYMBUSH	0,25 l
		KAFIL SUPER	0,25 l
		MASTOR	0,4 l
deltaméthrine	7,5 g	DECIS	0,3 l
fenvalérate	50 g	SUMICIDIN 10	0,5 l

#### Désherbage :

Les repousses de céréales sont parfois importantes dans certaines cultures (andains de moissonneuses-batteuses...) et bien développées. Il faut alors envisager rapidement leur destruction. Pour les interventions précoces préférer Fervin à 0,5 ou 0,75 kg/ha + Huile ou Fusilade à 1 l/ha + Actiplus ou Agral 90.

A partir du stade 4 feuilles il est possible d'utiliser également Kerb 50 à 0,75 kg/ha ou Légurame PM à 2 kg/ha.

Dans quelques secteurs de terre de Champagne le binage est devenu une pratique assez fréquente sur colza à grand écartement (45 cm). Il est réalisé sur sol sec en surface.

#### Limaces :

Des dégâts sont observés depuis plus de 10 jours, en bordure ou dans les zones motteuses, les sols caillouteux...

Si nécessaire utiliser les spécialités à base de métaldéhyde ou Mesurøl anti-limace à 3 ou 4 kg/ha.

#### REPONDEUR AVERTISSEMENTS (26) 87.40.78